

Aspecton® Junior Hustenstiller

Isländisch Moos

Für Kinder ab 1 Jahr

Bei Schleimhautreizungen in Mund und Rachen und damit verbundenem trockenem Reizhusten

Liebe Patientin, lieber Patient,

bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Was ist in Aspecton® Junior Hustenstiller enthalten?

100 ml Flüssigkeit enthalten 11,12 g Flüssigextrakt aus Lichen islandicus (1:1)

Sonstige Bestandteile:

Kaliumsorbat, Maltitol-Lösung, Citronensäure wasserfrei, Hydroxyethylcellulose, Macrogolglycerolhydroxystearat, Propylenglykol, Sucralose, Honigaroma, gereinigtes Wasser alkohol-, zucker-, gluten- und lactosefrei

Wann wird Aspecton® Junior Hustenstiller angewendet?

Aspecton® Junior Hustenstiller wird angewendet bei Schleimhautreizungen im Mund und Rachen und damit verbundenem trockenem Reizhusten.

Die Inhaltsstoffe des Isländisch Moos (Lichen islandicus) legen sich schützend über die Mund- und Rachenschleimhaut. Die beanspruchte Schleimhaut wird dadurch vor äußeren Reizen geschützt, und der Entstehung des Hustens wird vorgebeugt.

Die reizlindernde Wirkung wird durch den hohen Anteil an Schleimstoffen im Isländisch Moos-Extrakt erzielt. Diese verhindern ein Austrocknen der Schleimhäute durch Binden von Wasser an der Oberfläche.

Wann ist bei der Anwendung von Aspecton® Junior Hustenstiller Vorsicht geboten?

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe darf Aspecton® Junior Hustenstiller nicht angewendet werden.

Aspecton® Junior Hustenstiller ist nicht geeignet für Kinder unter 1 Jahr.

Dieses Medizinprodukt enthält Maltitol-Lösung. Bitte nehmen Sie Aspecton® Junior Hustenstiller erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

10 ml enthalten 3,43 g Maltitol. Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

Der Kalorienwert beträgt 2,3 kcal/g Maltitol. Maltitol kann eine leicht abführende Wirkung haben.

Macrogolglycerolhydroxystearat kann Magenverstimmung und Durchfall hervorrufen.

Dieses Medizinprodukt enthält 556 mg Propylenglycol pro 10 ml.

Nehmen Sie dieses Medizinprodukt nicht ein, wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie an einer Leber- oder Nierenerkrankung leiden, es sei denn, Ihr Arzt hat es Ihnen empfohlen.

Ihr Arzt führt möglicherweise zusätzliche Untersuchungen durch, während Sie dieses Medizinprodukt einnehmen.

Wie wird Aspecton® Junior Hustenstiller angewendet?


Kinder von 1 – 4 Jahren nehmen 2- bis 3-mal täglich 2,5 ml, Kinder von 5 – 10 Jahren 2-mal täglich 10 ml und Kinder und Jugendliche von 11 – 16 Jahren 3- bis 4-mal täglich 10 ml ein.

Der Packung liegt eine Dosierspritze zur genauen Dosierung bei.

Hinweise zur Anwendung der Dosierspritze:



1. Stecken Sie die Dosierspritze in die geöffnete Flasche, und drücken Sie sie nach unten, bis sie fest sitzt. Der Spritzenkolben soll dabei bis zum Anschlag in der Spritze stecken.



2. Drehen Sie die Flasche vorsichtig auf den Kopf, und ziehen Sie mit der Dosierspritze langsam die Flüssigkeit auf, indem Sie den Spritzenkolben bis zur gewünschten Markierung herausziehen.



3. Drehen Sie die Flasche wieder herum, und ziehen Sie die Spritze durch behutsames Drehen aus dem Flaschenhals. Verschließen Sie die Flasche wieder nach Entnahme.



4. Verabreichen Sie den Sirup entweder direkt mit der Spritze, indem Sie die Spritze langsam gegen die Innenseite der Wange entleeren oder auf einem Löffel.



5. Ziehen Sie nach der Anwendung den Kolben aus dem Spritzenzylinder, reinigen die Teile mit warmem Wasser und trocknen Sie die Spritze anschließend.

Hinweis für Diabetiker:

10 ml entsprechen 0,29 BE.

Unmittelbar nach der Einnahme von Aspecton® Junior Hustenstiller sollten Sie nicht essen oder trinken, weil das Produkt sonst eventuell wieder zu schnell von der Mund- und Rachenschleimhaut entfernt wird.

Falls die Beschwerden länger als 3 Tage ohne Besserung bestehen, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Welche Hinweise zur Haltbarkeit sind zu beachten?

Das Verfalldatum der ungeöffneten Flasche ist auf der Faltschachtel und dem Etikett aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Nach Anbruch der Flasche ist das Produkt 6 Monate verwendbar.

In welchen Packungsgrößen ist Aspecton® Junior Hustenstiller erhältlich?

Aspecton® Junior Hustenstiller ist in Flaschen mit 100 ml erhältlich.

Der Packung ist jeweils eine Dosierspritze beigelegt.



Hersteller Aspecton Junior Hustenstiller:
HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Straße 5
23562 Lübeck, Deutschland



0482



Hersteller der Dosierspritze:
Hubert De Backer nv
Laagstraat 59
9140 Temse, Belgien



1639

Stand der Gebrauchsanweisung

Juni 2024

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!